甘肃清水陇 07[#] 井井水变色的 水文地球化学机理分析

陈兰庆, 钟 心, 吴永信

(中国地震局兰州地震研究所, 甘肃 兰州 730000)

摘 要: 针对 2000 年 6 月 23 日甘肃清水陇 07[#] 井井水突然由原来的无色透明变为淡蓝色, 本文利用水质分析资料对其地球化学过程和机理进行了分析, 并结合大区域异常论证, 阐明了昆仑山口西 $M_s 8.1$ 地震之前青藏高原周围的构造活动与陇 07[#] 井井水变色的关系。

关键词: 井水变色; 水文地球化学; 机理分析

中图分类号: P315.72⁺3; P641.3

文献标识码: A

文章编号: 1000-0844(2005)03-0278-04

Hydrogeochemical Mechanism Analysis for Water Color Changing at Long-07[#] Well, in Qingshui County, Gansu

CHENG Lan-qin, ZHONG Xin, WU Yong-xin

(Lanzhou Institute of Seismology, CEA, Lanzhou 730000, China)

Abstract: On June 23, 2000, the water color of Long-07[#] observation well in Qingshui county, Gansu province, changed from achromatic to blue suddenly. Using the data of all-around water quality analysis, the hydrogeochemical process and mechanism of the event are studied, and the relation between tectonist activity in margin area of Qinghai-Tibet plateau and the water color changing event before west to Kunlun Mountain Pass $M_s 8.1$ earthquake is discussed, combining with other anomolies in eastern Gansu province.

Key words: Well water change color; Hydrogeochemical; Mechanism analyze

0 引言

2000 年 6 月 23 日甘肃清水县陇 07[#] 井发现井水流量由原来的 0.021 7 L/s 变为 0.025 6 L/s, 同时井水由原来的无色透明变为淡蓝色。这一现象引起地震观测人员和分析预报人员的高度重视, 甘肃省地震局在连夜派人前往现场考察的同时电令其观测人员每隔 4 h 取一个水样送兰州化验。弄清这一现象的成因以及与地震活动的关系, 对今后地震异常落实和地震分析预报具有重要的意义。本文通过水质分析结果判定和水文地球化学过程解析了这一现象发生的原因。为了查清引起井水变色的物质来源, 从青藏高原周围的一系列异常现象说明昆仑山口西 8.1 级特大地震之前的构造活动是这次井水变

色的根本原因。

1 陇 07[#] 井的基本情况

陇 07[#] 井位于甘肃清水县城西的李沟附近, 构造部位为陇西系南端, 秦岭北缘断裂北侧。井位距一条季节性河 100 m 左右, 一般来说河水不影响井水的流量。当地年降雨量 60 mm 左右。井水为第三系层间承压水, 含水层透水性较差, 流量小 ($Q = 0.022$ L/s)。含水层的岩性为较松散的沙砾岩和泥质砂岩。观测段为 25—165 m。水温 12 ℃。水质类型为 SO_4-Na 型水, 库尔洛夫表示为

$$M_{1.093} \frac{SO_{62.08}^4 HCO_{19.89}^3 CL_{17.53}}{Na_{74.87} Ca_{19.69}} T_{12}^{\circ}$$

收稿日期: 2005-06-08

中国地震局兰州地震研究所论著编号: LC20050052

作者简介: 陈兰庆(1960—), 女(汉族), 河南西平人, 工程师, 主要从事地震地下流体水质分析和观测研究工作。

2 水质分析结果

所取4个水样24日下午专人送达兰州,距最后一水样的取样时间已经4个多小时,蓝色已经自动消失。观测水样无色无嗅,清亮透明,可见少许黑色微小颗粒状物,而且随着静置时间延长有所增加。

首先对有可能显蓝色的特征元素二价铜离子等进行了检验,但没有检出它们的存在。为了证明黑色微小颗粒状物的属性,对3#样进行了过滤,对滤出的黑色颗粒物滴加稀盐酸,呈显黄色。接着对4个水样进行了全面的水质分析,分析结果见表1。

表1 清水院07#井水水质分析结果(单位:mg/L)

水样编号	1	2	3	4
取样时间	23日21时	24日01时	24日05时	24日09时
pH	8.1	8.51	8.91	8.50
K ⁺	3.3	3.2	3.2	3.2
Na ⁺	220	220	220	220
Ca ²⁺	19.64	18.84	18.44	19.64
Mg ²⁺	15.31	15.07	16.04	14.58
Cu ²⁺	0	0	0	0
Fe ²⁺	<1μg			
Fe ³⁺	0.75	1.28	0	1.4
CO ₃ ²⁻	13.26	13.26	13.26	13.26
HCO ₃ ⁻	128.11	114.63	128.11	121.37
F ⁻	2.1	2.1	2.1	2.1
Cl ⁻	87.36	87.56	87.77	87.17
SO ₄ ²⁻	377.96	379.89	385.67	386.64
NO ₃ ⁻	0	0	0	0
NO ₂ ⁻	0.014	0.09	0.012	0.014
SiO ₂	7.4	7.3	7.4	7.3
电导/[S·cm ⁻¹]	2.05	2.05	2.05	2.05

根据以上分析结果,可以看出以下基本事实:

(1) pH=8~9之间,为弱碱性;

(2) HCO₃⁻的毫克当量百分数由原来的19.89变为27.6,增加7.71,而HCO₃⁻是大气降水的主要特征,说明有浅源地表水混入的可能;

(3) SO₄²⁻的毫克当量百分数由原来的62.08变为61.7,说明有生物还原作用(SO₄²⁻-Na生物还原→HCO₃⁻-Na)发生。

(4) 有NO₂⁻存在,而没有NO₃⁻,证明了为还原性环境;

(5) 在不同时间所取的四个样品中,大多数离子都是稳定的,而唯有pH和Fe³⁺变化较大,在没有进行过滤的样品中都检测到了Fe³⁺,而经过过滤的3#样中没有检出Fe³⁺,滤出物加稀盐酸后呈黄色;

(6) 样品由蓝色变为无色,同时出现微量颗粒物,而且随时间而有增加,说明析出的颗粒物就是

Fe³⁺的氧化物。

根据需(4)、(5)两条可以断定取样后由于空气的介入有以下反应发生

就是说,水中原来的Fe³⁺被还原成Fe²⁺,Fe²⁺又和SO₄²⁻生成FeSO₄·7H₂O而显浅蓝色。尔后又由于Fe²⁺被氧化成Fe³⁺而水的蓝色退色。

3 水文地球化学过程解析

在有机物(淤泥及石油产物)和脱硫细菌存在的情况下,碳氢化合物可以同硫酸盐发生作用,从而使硫酸盐中的S还原

脱硫细菌的作用也会产生同样的作用

式(3)和(4)中R为Ca、Mg、Na等;C代表脱硫菌。

甲烷是天然有机物质的自然演化产物,它广泛存在于地壳中,因此在脱硫细菌的参与下,地下水中所含硫酸盐中的硫还原成H₂S是普遍的现象^[1]。

硫化氢又与水中三价铁离子发生反应

硫酸亚铁的水合物FeSO₄·7H₂O俗称绿矾,是一种天蓝色或浅绿色晶体,工业上常用来制作染料和蓝黑墨水等^[2-3]。在还原性环境的水中显浅蓝色,同时伴有SO₂的刺激性气味。

二价铁不稳定,很容易被氧化成三价铁,所以取样后随着时间的延续被空气中的O₂氧化而退色。

由于反应(2)、(3)、(4)的发生,CH₄和脱硫菌是不能和SO₄²⁻共存的,因此有机物和脱硫菌肯定是突然混入的,这一点可由井水变色的同时伴有流量突变来佐证。而且混入源不深,这可由大气降雨的主要特征成份HCO₃⁻的增加来证明。

4 与地震活动的关系分析

浅源的含有机物的地表水是如何混入引起了井水变色?与地震活动有没有关系?单独讨论这个问题很难深入,但如果将该井所发生的现象放到大环境中去分析,就比较清楚了。

在兰州以东的地区有多个包括地震地球化学观测泉井、地下水观测井和地球物理观测台点,在2000年前后的几年时间内发生了一系列的异常现象和显著的地震事件,见图1(图件由郑卫平提供)。

图1 甘肃东部地区2000年前后部分异常现象

Fig. 1 Some abnormal phenomenons in eastern Gansu before and after 2000.

2001年9月20日天水街子口热水井中白色絮状物大量析出,与清水陇07#井相距50多公里。这期间先后发生了2000年6月5日甘肃景泰 $M_s5.9$ 地震和2001年11月14日昆仑山口西 $M_s8.1$ 大地震。

这些有异常的台点都分布在青藏高原周缘地区,它们反应了在昆仑山口西发生 $M_s8.1$ 大地震之前,整个青藏高原及其周沿地区的构造活动和应力积累过程。可见陇07#井井水变色不是孤立的现象,而是昆仑山口西大地震孕育过程中的前兆反应之一。

从小区域来看,距该井100 m就有一条季节性河,河边有淤泥和有机物腐殖质存在;数公里的地方就有清水温泉,这里裂隙发育,周围存在不少的淤泥。具有提供有机物和脱硫菌的物质基础和条件。在构造应力的作用下,所产生的微裂隙为有机物和脱硫菌进入地下水提供了通道。

从时间上来看,陇07#井水变色发生在景泰 $M_s5.9$ 地震之后,所以也有人认为景泰地震是陇07#井井水变色的主要原因。至于是否是昆仑山口西 $M_s8.1$ 地震的前兆,认识上有不同意见,也难以区分。但陇07#井水变色发生事件毕竟发生在景泰地震18天之后,作者认为连同景泰地震也放进昆仑山口西地震的前兆序列更为合理。昆仑山口西 $M_s8.1$ 特大地震发生在青藏高原内部,在它的孕育过程中,整个青藏高原内部大规模的应力调整必定引起周边地区的应力状态调整和地壳运动,大面积、

多学科、长时间的异常都可以由此得到解释,也正是这种应力调整和地壳运动造成的井水附近地层的微裂隙为地表水的混入创造了条件。

井水变色的短期性说明了地表水混入通道的临时性,这是由裂隙地的物质条件和力学状态决定的。

5 几点认识

(1) 地下水及地球化学地震前兆观测项目有很多的震例,但机理问题一直是一个困扰着它的可信度的问题。研究异常机理,对于判断地震趋势和学科发展具有重要的意义。

(2) 地球深部的物质被观测到是需要特定条件的,尤其是突变性异常需要突发性的通道,一般来说浅源异常更为可信,浅源异常的机理之一就是不同水源的混入。而能够在一定条件下引起其它水混入的泉井可能是反应灵敏的泉井,因为它可能直接将地壳的运动及应力的变化转换为化学组分的变化。

(3) 地震预报在科学意义上还没有过关,因此更应该对所观测到的现象进行深入的研究,才有可能向实现具有物理意义的预报逐步靠近。

[参考文献]

- [1] 李学礼. 水文地球化学[M]. 北京: 原子能出版社, 1982.
- [2] 无机化学编写组. 无机化学[M]. 北京: 人民教育出版社, 1978.
- [3] 戴安邦, 等. 无机化学教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 1958.